

Probloc

Probloc est particulièrement bien adapté pour la lutte contre les rats et les souris dans les zones humides et les égoûts grâce à une bonne résistance lors immersion courte dans l'eau. Probloc est disponible en différents poids (20g, 25g, 100g) avec ou sans crochet. Le crochet assure une application plus facile dans les égouts.

Recommandations d'usage et de dosage

Diagnostiquer l'infestation en termes d'importance et d'expansion.

Identifier les endroits qui devraient idéalement être munis de points d'appât : près des lieux de nidification, le long des pistes, près des sites d'alimentation habituels, mais aussi dans les structures creuses.

Retirer tous les aliments possibles en compétition avec l'appât.

Contrôler régulièrement la consommation d'appâts (tous les 2 à 3 jours pour les souris et tous les 5 à 7 jours pour les rats) et remplacer les appâts consommés ou abîmés jusqu'à arrêt total de la consommation.

Répéter le traitement si des signes indiquent une nouvelle infestation

Éliminer les causes probables de l'infestation. Prenez les mesures d'hygiène nécessaires, éliminer l'accès aux aliments et assurez une herméticité adéquate afin d'éviter une nouvelle infestation.

A utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés.

Une utilisation en points d'appât couverts et protégés est réservée aux professionnels ayant des compétences avancées démontrées

Lors de l'usage en égouts s'assurer que les appâts ne rentrent pas en contact avec les eaux usées et fixé les blocs par un fil pour s'assurer que le bloc ne soit pas enlevé

Temps nécessaire pour observer l'effet sur les rongeurs :

Les symptômes apparaissent quelques heures après l'ingestion et les rongeurs meurent quelques jours plus tard, sans éveiller la méfiance des congénères. Deux ou plusieurs consommations d'appâts sont nécessaires pour avoir une mortalité retardée (4-10 jours) : la plupart des rongeurs meurent dans leurs terriers hors de la vue.

Dosage

Souris (*Mus musculus*), usage intérieur et extérieur autour des bâtiments : 20 à 30g d'appât par station d'appât tous les 5 mètres. Si en cas d'infestation forte plusieurs stations d'appât sont nécessaires, la distance minimale séparant deux stations doit être de 2 mètres.

Rat brun (*Rattus norvegicus*), usage intérieur et extérieur autour des bâtiments : 90 à 100g d'appât par station d'appât. Si plusieurs stations d'appât sont nécessaires, la distance minimale séparant deux stations doit être de 5 mètres.

Nous conseillons de prévoir suffisamment de stations d'appât en fonction de l'infestation, pour favoriser la consommation de l'appât. Si un point d'appât est complètement consommé, la quantité doit être remplacée rapidement et le nombre de stations d'appâts augmenté. Continuer à remplacer les appâts jusqu'à ce qu'ils soient laissés intacts par les rongeurs.

Rats bruns en égouts

Infestation faible : 90 à 100g tous les 30 à 50m / par regard Infestation forte : 300g tous les 30 à 50m / par regard

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et la notice d'utilisation du produit pour les instructions complètes d'utilisation et les précautions d'usage.



**BIOCIDE TP 14,
RODENTICIDE
CIRCUIT RESTREINT**

TYPE DE FORMULATION

Appât prêt à l'emploi
Bloc hydrofuge 20g, 25g ou 100g

**N° AUT BELGIQUE
BE2012-0019**

**N° AUT LUXEMBOURG
31/12/L-000**

MATIÈRE ACTIVE

Difenacoum 0.005%
Contient du Bitrex

CLASSIFICATION CHIMIQUE

4-hydroxycoumarin.
Anticoagulant 2^{ème} génération

MÉCANISME D'ACTION

Anticoagulant, antagoniste de la
vitamine K

CIBLE

Souris (*Mus musculus*)
Rat brun (*Rattus norvegicus*)

CODES ET EMBALLAGES

RD-DIF-30023 Seau 5kg
Problocs 20g coulés
RD-DIF-30006 Carton 7kg
Problocs 20g coulés
RD-DIF-35004 Carton 10kg
Problocs 25g extrudés
RD-DIF-33005 Carton 10kg
Problocs 100g crochet

ARMOSA SA/NV

1, rue des Tuiliers
B-4480 Hermalle-sous-Huy

T. +32(0)85 519 519

M. info-be@armosa.eu W. www.armosa.eu

